Resultados del Congreso de

San Antonio Breast Cancer (SABCS 2020)

Actualización de los resultados en supervivencia global del estudio fase III MONALEESA-7 en pacientes pre- o perimenopáusicas con cáncer de mama avanzado receptores hormonales +/HER2– tratadas con terapia hormonal +/– ribociclib

Análisis y síntesis elaborados por el staff médico
de Circle Press a partir del estudio:

Actualización de los resultados en supervivencia global del estudio fase III MONALEESA-7 en pacientes pre- o perimenopáusicas con cáncer de mama avanzado receptores hormonales +/HER2- tratadas con terapia hormonal +/- ribociclib

Tripathy D, et. al.
Department of Breast Medical Oncology, Division of Cancer Medicine

Prohibida su reproducción parcial o total - MATERIAL EXCLUSIVO CIRCLE

El estudio de fase III MONALEESA-7 evaluó pacientes pre- o perimenopáusicas con cáncer de mama avanzado (CMa) receptores hormonales (RH) + y HER2- que recibieron tratamiento hormonal (TH) +/- ribociblib. Las pacientes podían haber recibido previamente una línea de quimioterapia por su CMa. El objetivo principal fue la supervivencia libre de progresión (SLP).

Algunos resultados preliminares mostraron beneficio en supervivencia global (SG) a favor del brazo con ribociclib, con un HR para muerte de 0.71 (IC 95% 0.54-0.91).[1] Luego del primer análisis, se suprimió el ciego del estudio y 15 pacientes que estaban recibiendo placebo realizaron cruce del brazo, para recibir ribociclib. Se presentan los resultados de mSG, con una mediana de seguimiento de 53.5 meses, 58.7 meses con ribociclib

SG actualizada en la población con intención de tratamiento

Gráfica 1



TH: terapia hormonal.

y 48 meses con placebo (HR 0.763; IC 95% 0.608-0.956) **(ver Gráfica 1)**.

El beneficio en SG se observó con las diferentes opciones de terapia hormonal.

El tiempo a la quimioterapia, así como la supervivencia libre de quimioterapia, fueron mayores con ribociclib versus placebo **(ver Gráfica 2)**.

cción parcial o total - Prohibida su reproducción parcial o total - Prohibida su reproducc
E PRESS
N CORRECCIÓ

Tiempo a la quimioterapia

Gráfica 2



	Ribociclib + TH	Placebo + TH
Eventos/n	144/335	173/337
SG mediana, meses	50.5	36.8
HR (IC 95%)	0.634 (0.556-0.867)	

	Ribociclib + TH	Placebo + TH
Eventos/n	130/335	236/337
SG mediana, meses	42.4	26.4
HR (IC 95%)	0.666 (0.550-0.808)	

TH: terapia hormonal.

Podemos concluir que el beneficio en SG con ribociclib + terapia hormonal es consistente y continúa en el tiempo de seguimiento. La combinación de ribociclib + TE también prolongó el tiempo a la quimioterapia y la supervivencia libre de quimioterapia. Estos datos son una prueba contundente para considerar el tratamiento con ribociclib en pacientes pre- o perimenopáusicas con CMa RH+/HER2-.

Referencias:

1- *Im et. al. NEJM 2019;381:307-316.*

CiRCLE PRESS
www.circlepress.info
0054 11 4784 5129

Revista de divulgación científica, de distribución gratuita y dirigida a profesionales de la salud.

El contenido de este trabajo representa un análisis, revisión bibliográfica y síntesis editorial. Los conceptos y las conclusiones pertenecen a los autores y no representan las opiniones o recomendaciones del laboratorio patrocinante. La información resumida puede ser preliminar y estar sujeta a cambios. Estos datos se incluyen solo para la capacitación del médico y la información tiene fines exclusivamente educativos.

Resumen elaborado por el staff de Circle Press.
Imagen de tapa: shutterstock.com



Material exclusivo para el profesional de la salud
P3: MX2101287670 Fecha de expiración: enero/2023
Calz. de Tlalpan No. 1779 Col. San Diego Churubusco,
Ciudad de México. C.P. 04120

NOVARTIS